Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Pregabalin Grindeks 25 mg tvrde kapsule
Pregabalin Grindeks 75 mg tvrde kapsule
Pregabalin Grindeks 150 mg tvrde kapsule
Pregabalin Grindeks 300 mg tvrde kapsule
pregabalin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Pregabalin Grindeks i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pregabalin Grindeks
3. Kako uzimati Pregabalin Grindeks
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pregabalin Grindeks
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pregabalin Grindeks i za što se koristi

Pregabalin Grindeks spada u skupinu lijekova koji se upotrebljavaju za liječenje epilepsije, neuropatske boli i generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP) u odraslih osoba.

Periferna i centralna neuropatska bol: Pregabalin Grindeks se koristi za liječenje dugotrajne boli uzrokovane oštećenjem živaca. Perifernu neuropatsku bol mogu uzrokovati različite bolesti, primjerice šećerna bolest ili herpes zoster. Osjet bola može se opisati kao vrućina, žarenje, pulsirajuća bol, sijevajuća bol, probadanje, oštra bol, grčevi, stalna tupa bol, trnci, utrnulost, bockanje. Periferna i centralna neuropatska bol mogu biti povezane i s promjenama raspoloženja, poremećajem spavanja te umorom (iscrpljenošću), a mogu utjecati na tjelesno i socijalno funkcioniranje i ukupnu kvalitetu života.

Epilepsija: Pregabalin Grindeks se koristi za liječenje nekih oblika epilepsije (parcijalnih napadaja sa ili bez sekundarne generalizacije) u odraslih osoba. Liječnik će Vam propisati lijek Pregabalin Grindeks za liječenje epilepsije kada lijekovi koje ste do sada uzimali bolest ne drže pod kontrolom. Lijek Pregabalin Grindeks morate uzimati kao dodatak postojećim lijekovima. Pregabalin Grindeks nije namijenjen za samostalnu primjenu, nego se uvijek mora uzimati u kombinaciji s drugim antiepileptičkim lijekovima.

Generalizirani anksiozni poremećaj: Pregabalin Grindeks se koristi za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja (GAP). Simptomi GAP-a su dugotrajna prekomjerna tjeskoba i zabrinutost koje je teško kontrolirati. GAP može uzrokovati i nemir ili osjećaj napetosti ili bezizlaznosti, brzo iscrpljivanje (umaranje), poteškoće s koncentracijom ili prisjećanjem, razdražljivost, napetost mišića ili poremećaj spavanja. To se razlikuje od stresa i napetosti u svakodnevnom životu.

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pregabalin Grindeks

Nemojte uzimati Pregabalin Grindeks
Ako ste alergični na pregabalin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Pregabalin Grindeks.
- Neki bolesnici koji su uzimali lijek Pregabalin Grindeks prijavili su simptome koji ukazuju na alergijsku reakciju. Ti simptomi uključuju oticanje lica, usana, jezika i grla, kao i prošireni osip kože. Ako se pojavi neka od tih reakcija, morate se odmah javiti svom liječniku.
- Tijekom liječenja pregabalinom zabilježeni su ozbiljni kožni osipi, uključujući StevensJohnsonov sindrom i toksičnu epidermalnu nekrolizu. Prekinite primjenu pregabalina i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od simptoma povezanih s navedenim ozbiljnim kožnim reakcijama opisanima u dijelu 4.
- Liječenje lijekom Pregabalin Grindeks povezuje se s pojavom omaglice i pospanosti, što može povećati broj slučajnih ozljeda (padova) u starijih bolesnika. Stoga, morate biti oprezni dok se ne naviknete na sve moguće učinke lijeka.
- Pregabalin Grindeks može uzrokovati zamagljen vid, gubitak vida ili druge promjene vida, od kojih su mnoge privremene. Morate odmah obavijestiti svog liječnika ako primijetite bilo kakve promjene vida.
- Nekim bolesnicima sa šećernom bolešću koji dobiju na težini dok uzimaju pregabalin će možda trebati promijeniti terapiju lijekovima protiv šećerne bolesti.
- Neke nuspojave, poput pospanosti, mogu se javljati češće jer bolesnici s ozljedom leđne moždine možda uzimaju druge lijekove za liječenje, primjerice, boli ili grčeva, koji imaju slične nuspojave kao pregabalin. Ove nuspojave mogu biti teže kada se ti lijekovi uzimaju zajedno.
- U nekih je bolesnika pri uzimanju lijeka Pregabalin Grindeks prijavljeno zatajenje srca; radilo se uglavnom o starijim bolesnicima s postojećim bolestima srca i krvožilja. **Prije uzimanja ovog lijeka morate obavijestiti svog liječnika ako ste bolovali od neke bolesti srca.**
- U nekih je bolesnika pri uzimanju lijeka Pregabalin Grindeks prijavljeno zatajenje bubrega. Ako tijekom uzimanja lijeka Pregabalin Grindeks primijetite da manje mokrite, morate o tome obavijestiti svog liječnika jer se prekidom primjene lijeka to može poboljšati.
- Neki bolesnici koji se liječe antiepileptičkim lijekovima kao što je Pregabalin Grindeks razmišljali su o samoozljeđivanju ili samoubojstvu ili su pokazali samoubilačko ponašanje. Ako Vas u bilo kojem trenutku obuzmu takve misli ili ako pokažete takvo ponašanje, odmah se javite svom liječniku.
- Kada se Pregabalin Grindeks uzima s drugim lijekovima koji mogu uzrokovati zatvor (kao što su neke vrste lijekova protiv bolova), moguće je da se pojave probavne tegobe (primjerice zatvor, blokada ili paraliza crijeva). Obavijestite svog liječnika ako imate zatvor, pogotovo ako ste skloni toj tegobi.
- Prije uzimanja ovog lijeka obavijestite svog liječnika ako ste ikad zlouporabili ili bili ovisni o alkoholu, lijekovima koji se izdaju na recept ili ilegalnim drogama. To može značiti da ste izloženi većem riziku od razvijanja ovisnosti o lijeku Pregabalin Grindeks.
- Za vrijeme uzimanja ili nedugo nakon prestanka uzimanja lijeka Pregabalin Grindeks prijavljene su konvulzije. Ako doživite konvulzije, odmah se javite liječniku.
- Prijavljeno je smanjenje moždane funkcije (encefalopatija) u nekih bolesnika koji su uzimali lijek Pregabalin Grindeks, a bolovali su i od drugih bolesti. Obavijestite svog liječnika ako ste bolovali od neke ozbiljne bolesti, uključujući bolesti jetre ili bubrega.
- Prijavljeno je otežano disanje. Ako bolujete od poremećaja živčanog sustava, poremećaja disanja, oštećenja funkcije bubrega ili imate više od 65 godina, liječnik će Vam možda propisati drugačiji režim doziranja. Obratite se svom liječniku ako imate problema s otežanim disanjem ili plitak dah.

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

Ovisnost

Neke osobe mogu postati ovisne o lijeku Pregabalin Grindeks (potreba da nastave uzimati lijek). Mogu iskusiti učinke ustezanja nakon što prestanu uzimati lijek Pregabalin Grindeks (pogledajte dio 3, „Kako uzimati Pregabalin Grindeks“ i „Ako prestanete uzimati Pregabalin Grindeks“). Ako se brinete da biste mogli postati ovisni o lijeku Pregabalin Grindeks, važno je da se obratite za savjet svom liječniku.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih znakova dok uzimate lijek Pregabalin Grindeks, to može upućivati na to da ste postali ovisni o lijeku:

- imate potrebu uzimati lijek dulje nego što je to preporučio liječnik koji Vam je propisao lijek,
- osjećate potrebu uzeti više lijeka od preporučene doze,
- ne koristite lijek iz razloga zbog kojih Vam je propisan,
- više puta ste neuspješno pokušali prestati s primjenom ili kontrolirati Vašu primjenu lijeka,
- osjećate se loše kada prestanete uzimati lijek, a osjećate se bolje čim ponovno počnete uzimati lijek.

Ako ste primijetili bilo koji od ovih znakova, razgovarajte s Vašim liječnikom o najboljem obliku liječenja za Vas i ujedno o tome kada je prikladno prekinuti s primjenom lijeka i kako to izvesti na siguran način.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) nisu ustanovljene te stoga pregabalin ne treba koristiti u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Pregabalin Grindeks

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Pregabalin Grindeks i neki drugi lijekovi mogu djelovati jedni na druge (interakcija). Kada se uzima s nekim drugim lijekovima koji imaju sedativni učinak (uključujući opioide), Pregabalin Grindeks može pojačati te učinke i dovesti do zatajenja disanja, kome i smrti. Omaglica, pospanost i smanjenje koncentracije mogu se pojačati ako se Pregabalin Grindeks uzima zajedno s lijekovima koji sadrže:

- Oksikodon - (koristi se protiv bolova)
- Lorazepam - (koristi se za liječenje tjeskobe)
- Alkohol

Pregabalin Grindeks se može uzimati s oralnim kontraceptivima.

Pregabalin Grindeks s hranom, pićem i alkoholom

Pregabalin Grindeks kapsule mogu se uzimati s hranom ili bez nje. Preporučuje se da ne pijete alkohol dok uzimate lijek Pregabalin Grindeks.

Trudnoća i dojenje

Pregabalin Grindeks se ne smije uzimati tijekom trudnoće ili dojenja, osim ako Vam liječnik nije rekao drugačije. Primjena pregabalina u prva 3 mjeseca trudnoće može uzrokovati urođene mane u nerođenog djeteta koje će biti potrebno liječiti. U ispitivanju u kojem su pregledani podaci žena u nordijskim zemljama koje su uzimale pregabalin tijekom prva 3 mjeseca trudnoće, 6 novorođenčadi na svakih 100 imalo je takve urođene mane, u usporedbi s 4 novorođenčeta na svakih 100 rođenih u žena koje u ispitivanju nisu bile liječene pregabalinom. Prijavljene su abnormalnosti lica (orofacijalni rascjepi), očiju, živčanog sustava (uključujući mozak), bubrega i spolnih organa.

Žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

Upravljanje vozilima i strojevima
Pregabalin Grindeks može izazvati omaglicu, pospanost i smanjenu koncentraciju. Ne biste trebali voziti, rukovati složenim strojevima ni poduzimati druge potencijalno opasne aktivnosti dok ne utvrdite utječe li ovaj lijek na Vašu sposobnost da to činite.

3. Kako uzimati Pregabalin Grindeks

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ne uzimajte više lijeka nego što Vam je propisano.

Vaš će liječnik odrediti koja doza je prikladna za Vas. Pregabalin Grindeks je namijenjen samo za primjenu kroz usta.

Periferna i centralna neuropatska bol, epilepsija ili generalizirani anksiozni poremećaj:
- Uzmite onoliko kapsula koliko Vam je odredio liječnik.
- Doza, koja je prilagođena Vama i Vašoj bolesti, u pravilu će iznositi između 150 mg i 600 mg svakoga dana.
- Liječnik će Vam reći da uzmete lijek Pregabalin Grindeks dva puta ili tri puta na dan. Ako lijek Pregabalin Grindeks uzimate dva puta na dan, uzmite jednu dozu ujutro te jednu navečer, svakoga dana otprilike u isto vrijeme. Ako lijek Pregabalin Grindeks uzimate tri puta na dan, uzmite jednu dozu ujutro, jednu dozu poslijepodne te jednu navečer, svakoga dana otprilike u isto vrijeme.

Ako Vam se čini da je djelovanje lijeka Pregabalin Grindeks prejako ili preslabo, porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.
Ako ste bolesnik u starijoj dobi (iznad 65 godina), lijek Pregabalin Grindeks trebate uzimati normalno, osim ako imate problema s bubrezima.

Ako imate problema s bubrezima, liječnik Vam može propisati drugačiji raspored doziranja i/ili dozu.

Kapsule progutajte cijele s vodom.
Nastavite uzimati lijek Pregabalin Grindeks dok Vam liječnik ne kaže da prestanete.

Ako uzmete više lijeka Pregabalin Grindeks nego što ste trebali
Odmah nazovite svog liječnika ili otiđite u hitnu službu najbliže bolnice. Uzmite sa sobom kutiju ili bocu Pregabalin Grindeks kapsula. Kao posljedica uzimanja previše Pregabalin Grindeks kapsula možete biti pospani, zbunjeni, uznemireni ili nemirni. Prijavljeni su također i napadaji i nesvjestica (koma).

Ako ste zaboravili uzeti lijek Pregabalin Grindeks
Važno je da Pregabalin Grindeks kapsule uzimate redovito, svakoga dana u isto vrijeme. Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju samo nastavite sa sljedećom dozom kao i obično. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Pregabalin Grindeks
Nemojte naglo prestati uzimati lijek Pregabalin Grindeks. Ako želite prestati uzimati lijek Pregabalin Grindeks, prvo razgovarajte o tome sa svojim liječnikom. On će Vam reći kako da to napravite. Ako se liječenje prekida, to treba učiniti postupno tijekom najmanje tjedan dana.

Morate znati da nakon prekida kratkotrajnog ili dugotrajnog liječenja lijekom Pregabalin Grindeks mogu nastupiti određene nuspojave, takozvani učinci ustezanja. Navedeni učinci uključuju poteškoće sa spavanjem, glavobolju, mučninu, osjećaj tjeskobe, proljev, simptome nalik gripi, konvulzije,

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

nervozu, depresiju, misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, bol, znojenje i omaglicu. Ti učinci mogu biti češći ili teži ako ste lijek Pregabalin Grindeks uzimali dulje vrijeme. Ako primijetite učinke ustezanja, trebate se obratiti svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba
- omaglica, omamljenost, glavobolja.

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba
- povećan apetit
- ushićenje, smetenost, dezorijentiranost, smanjenje seksualne želje, razdražljivost
- poremećaj pažnje, nespretnost, poremećaj pamćenja, gubitak pamćenja, nevoljno drhtanje (tremor), poteškoće pri govoru, osjećaj trnaca, utrnulost, sedacija, letargija, nesanica, umor, neuobičajeno osjećanje
- zamagljen vid, dvoslike
- vrtoglavica, poteškoće s ravnotežom, pad
- suha usta, zatvor, povraćanje, vjetrovi, proljev, mučnina, otečen trbuh
- poteškoće s erekcijom
- oticanje tijela, uključujući udove
- osjećaj pijanosti, neuobičajen način hodanja
- porast tjelesne težine
- grčevi u mišićima, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima
- grlobolja.

Manje česte: mogu se javiti u više do 1 na 100 osoba
- gubitak teka, gubitak tjelesne težine, niska razina šećera u krvi, visoka razina šećera u krvi
- promijenjena slika o sebi, nemir, depresija, uznemirenost, promjene raspoloženja, poteškoće u pronalaženju riječi, halucinacije, neuobičajeni snovi, napadaj panike, apatija, agresija, povišeno raspoloženje, slabljenje mentalnih sposobnosti, poteškoće pri razmišljanju, povećanje seksualne želje, tegobe sa spolnom funkcijom uključujući nemogućnost postizanja orgazma, odgođena ejakulacija
- promjene vida, neuobičajeni pokreti očiju, promjene vida uključujući gubitak perifernog vida (kao da gledate kroz cijev), bljeskovi svjetla, trzajni pokreti, smanjeni refleksi, pojačana aktivnost, omaglica pri ustajanju, osjetljivost kože, gubitak osjeta okusa, osjećaj pečenja, nevoljni pokreti pri kretanju, smanjena svijest, gubitak svijesti, nesvjestica, pojačana osjetljivost na buku, loše osjećanje
- suhe oči, oticanje očiju, bol u oku, slabost očiju, suzne oči, nadraženost očiju
- poremećaji srčanog ritma, ubrzani puls, nizak krvni tlak, visok krvni tlak, promjene otkucaja srca, zatajenje srca
- navale crvenila, navale vrućine
- otežano disanje, suhoća nosne sluznice, začepljen nos
- pojačano stvaranje sline, žgaravica, utrnulost oko usta
- znojenje, osip, zimica, vrućica
- trzanje mišića, oticanje zglobova, ukočenost mišića, bol uključujući bol u mišićima, bol u vratu
- bol u dojkama
- otežano ili bolno mokrenje, inkontinencija
- slabost, žeđ, stezanje u prsištu

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

- promjene u rezultatima pretraga krvi i jetre (povišene vrijednosti kreatin fosfokinaze u krvi, povišene vrijednosti alanin aminotransferaze, povišene vrijednosti aspartat aminotransferaze, smanjen broj krvnih pločica, smanjen broj neutrofila, povećanje kreatinina u krvi, snižene vrijednosti kalija u krvi)
- preosjetljivost, oticanje lica, svrbež, koprivnjača, curenje iz nosa, krvarenje iz nosa, kašalj hrkanje
- bolne mjesečnice
- hladnoća šaka i stopala.

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba
- neuobičajen osjet mirisa, nemogućnost fokusiranja slike, promijenjena percepcija dubine, osjećaj svjetline pri gledanju, gubitak vida
- proširene zjenice, ukrižene oči
- hladan znoj, stezanje u grlu, oticanje jezika
- upala gušterače
- otežano gutanje
- usporeni ili umanjeni pokreti tijela
- poteškoće pri pravilnom pisanju
- nakupljanje tekućine u trbuhu
- tekućina u plućima
- konvulzije
- promjene na elektrokardiogramu (EKG-u) koje odgovaraju poremećajima srčanog ritma
- oštećenje mišića
- iscjedak iz dojke, neuobičajen rast dojki, rast dojki u muškaraca
- prekid menstrualnog ciklusa
- zatajenje bubrega, smanjen volumen mokraće, zadržavanje mokraće
- smanjen broj bijelih krvnih stanica
- neprilagođeno ponašanje, samoubilačko ponašanje, razmišljanje o samoubojstvu
- alergijske reakcije koje mogu obuhvaćati otežano disanje, upalu očiju (keratitis) i ozbiljne kožne reakcije koje obilježavaju crvenkaste mrlje u razini kože, u obliku mete ili kružnog oblika, koje izbijaju na trupu, često s mjehurićima u sredini, ljuštenje kože, čirevi u ustima, grlu, nosu, na spolnim organima i očima. Ovim ozbiljnim kožnim osipima mogu prethoditi vrućica i simptomi slični gripi (Stevens-Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza).
- žutica (žutilo kože i bjeloočnica)
- parkinsonizam, odnosno simptomi nalik Parkinsonovoj bolesti; kao što su tremor, bradikinezija (smanjena sposobnost kretanja) i rigiditet (ukočenost mišića).

Vrlo rijetke: mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba
- zatajenje jetre
- hepatitis (upala jetre).

Nepoznate: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- razvijanje ovisnosti o lijeku Pregabalin Grindeks („ovisnost o lijeku“).

Morate znati da nakon prekida kratkotrajnog ili dugotrajnog liječenja lijekom Pregabalin Grindeks mogu nastupiti određene nuspojave, takozvani učinci ustezanja (pogledajte dio „Ako prestanete uzimati lijek Pregabalin Grindeks“).

Primijetite li oticanje lica ili jezika, ili se na koži pojavi crvenilo, mjehurići ili ljuštenje, morate odmah potražiti savjet liječnika.

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

Neke nuspojave, poput pospanosti, mogu se javljati češće jer bolesnici s ozljedom leđne moždine možda uzimaju druge lijekove za liječenje, primjerice, boli ili grčeva, koji imaju slične nuspojave kao pregabalin. Ove nuspojave mogu biti ozbiljnije kada se ti lijekovi uzimaju zajedno.

Sljedeće nuspojave prijavljene su u razdoblju nakon stavljanja lijeka u promet: otežano disanje, plitak dah.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Pregabalin Grindeks

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, blisteru ili bočici iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pregabalin Grindeks sadrži
Djelatna tvar je pregabalin. Jedna tvrda kapsula sadrži 25 mg, 75 mg, 150 mg, ili 300 mg pregabalina.

Drugi sastojci su manitol (E421), kukuruzni škrob, talk.

Ovojnica kapsule sadrži želatinu (E441), crni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172) (sve jačine osim 25 mg) i crna tinta za označavanje (koja sadrži šelak (E904), crni željezov oksid (E172), propilenglikol (E1520), kalijev hidroksid (E525)).

Kako Pregabalin Grindeks izgleda i sadržaj pakiranja

Pregabalin Grindeks 25 mg tvrde kapsule: svjetlosiva kapica i tijelo. Na kapici je crnom tintom otisnuto „PREG“, a na tijelu „25“. Duljina kapsule je približno 14 mm.
Pregabalin Grindeks 75 mg tvrde kapsule: zlatna kapica i svjetlosivo tijelo. Na kapici je crnom tintom otisnuto „PREG“, a na tijelu „75“. Duljina kapsule je približno 14 mm.
Pregabalin Grindeks 150 mg tvrde kapsule: svjetlosiva kapica i tijelo. Na kapici je crnom tintom otisnuto „PREG“, a na tijelu „150“. Duljina kapsule je približno 18 mm.
Pregabalin Grindeks 300 mg tvrde kapsule: zlatna kapica i svjetlosivo tijelo. Na kapici je crnom tintom otisnuto „PREG“, a na tijelu „300“. Duljina kapsule je približno 22 mm.

Pregabalin Grindeks 25 mg tvrde kapsule
Dostupne u blister pakiranjima koja sadrže 14, 56, 60, 84, 90, 98 ili 100 tvrdih kapsula ili u jediničnim blister pakiranjima koja sadrže 100 x 1 tvrdih kapsula.

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

Pregabalin Grindeks 75 mg tvrde kapsule
Dostupne u blister pakiranjima koja sadrže 14, 28, 56, 60, 84, 90, 98 ili 100 tvrdih ili 100 tvrdih kapsula ili u jediničnim blister pakiranjima koja sadrže 100 x 1 tvrdih kapsula.
HDPE bočica s PP zatvaračem s navojem sigurnim za djecu koja sadrži 200 tvrdih kapsula.

Pregabalin Grindeks 150 mg tvrde kapsule
Dostupne u blister pakiranjima koja sadrže 14, 28, 56, 60, 84, 90, 98 ili 100 tvrdih kapsula ili u jediničnim blister pakiranjima koja sadrže 100 x 1 tvrdih kapsula.
HDPE bočica s PP zatvaračem s navojem sigurnim za djecu koja sadrži 200 tvrdih kapsula.

Pregabalin Grindeks 300 mg tvrde kapsule
Dostupne u blister pakiranjima koja sadrže 14, 28, 56, 60, 100 ili 200 tvrdih kapsula ili u jediničnim blister pakiranjima koja sadrže 100 x 1 tvrdih kapsula.
HDPE bočica s PP zatvaračem s navojem sigurnim za djecu koja sadrži 200 tvrdih kapsula.
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
AS GRINDEKS
Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija
Tel: +371 67083205
E-mail: grindeks@grindeks.com

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Clinres farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 2396 900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija	Pregabalin Grindeks 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg Hartkapseln
Belgija	Pregabalin Grindeks 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg harde capsules
Bugarska	Прегабалин Гриндекс 50 mg, 75 mg, 150 mg твърди капсули Pregabalin Grindeks 50 mg, 75 mg, 150 mg hard capsules
Hrvatska	Pregabalin Grindeks 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg tvrde kapsule
Češka	Pregabalin Grindeks
Njemačka	Pregabalin Grindeks 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg Hartkapseln
Danska	Pregabalin Grindeks
Estonija	Pregabalin Grindeks
Finska	Pregabalin Grindeks 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg, 300 mg kova kapseli
Francuska	PREGABALINE GRINDEKS 25 mg, gélule PREGABALINE GRINDEKS 50 mg, gélule PREGABALINE GRINDEKS 75 mg, gélule PREGABALINE GRINDEKS 100 mg, gélule PREGABALINE GRINDEKS 150 mg, gélule PREGABALINE GRINDEKS 200 mg, gélule PREGABALINE GRINDEKS 300 mg, gélule
Grčka	Pregabalin/Grindeks

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO

Mađarska	Pregabalin Grindeks 75 mg, 150 mg, 300 mg kemény kapszula
Irska	Pregabalin Grindeks 25 mg hard capsules Pregabalin Grindeks 50 mg hard capsules Pregabalin Grindeks 75 mg hard capsules Pregabalin Grindeks 100 mg hard capsules Pregabalin Grindeks 150 mg hard capsules Pregabalin Grindeks 200 mg hard capsules Pregabalin Grindeks 300 mg hard capsules
Italija	Pregabalin Grindeks
Latvija	Pregabalin Grindeks 75 mg, 150 mg cietās kapsulas
Litva	Pregabalin Grindeks 75 mg kietosios kapsulės Pregabalin Grindeks 150 mg kietosios kapsulės
Nizozemska	Pregabaline Grindeks 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg harde capsules
Norveška	Pregabalin Grindeks
Poljska	Pregabalin Grindeks
Portugal	Pregabalin Grindeks 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg cápsulas duras
Rumunjska	Pregabalină Grindeks 75 mg, capsule Pregabalină Grindeks 150 mg, capsule Pregabalină Grindeks 300 mg capsule
Španjolska	Pregabalina Grindeks 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg cápsulas duras EFG
Slovačka	Pregabalin Grindeks 75 mg, 150 mg, 300 mg tvrdé kapsuly
Slovenija	Pregabalin Grindeks 25 mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg trde kapsule
Švedska	Pregabalin Grindeks

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u svibnju 2026.

HALMED
06 - 05 - 2026
ODOBRENO